Sondennahrungen

STANDARDNAHRUNGEN

	Fresubin Original	Fresubin Original Fibre	Fresubin Energy Fibre	Fresubin 1000 Complete	Fresubin 1200 Complete	Fresubin 1500 Complete	Fresubin 1800 Complete	Fresubin 2250 Complete	Fresubin Energy
	1,0–1,2 kcal/ml							1,5 kcal/ml	
Hauptindikationen	Für alle Sondennahrungen: • Kau- und Schluckstörungen • Behinderung der Nahrungspassage	• Ballaststoffunverträglichkeit z.B. bei: CED[1] - Kurzdarm (Stabilisierungsphase) - Postoperative Dickdarmstenose	• Mittlerer Energiebedarf	• Milcheiweiß-unverträglichkeit	• Geringer Energiebedarf • Langzeit-immobile Patienten	• Geringer Energiebedarf • Langzeit-immobile Patienten	• Mittlerer Energiebedarf	• Sehr geringer Energiebedarf oder zusätzlich zur oralen oder parenteralen Ernährung • Langzeit-immobile Patienten	• Mittlerer Energiebedarf und erhöhter Eiweißbedarf z.B. bei: - Wundheilungsstörungen - chirurgischen Patienten - geriatrischen Patienten
Produkteigenschaften	• Normokalorisch • Ohne Ballaststoffe	• Normokalorisch • Mit Ballaststoffen	• Normokalorisch • Mit Ballaststoffen	• Normokalorisch • Mit Ballaststoffen • Milcheiweißfrei	• Hochkalorisch • Mit Ballaststoffen • Eiweißreich • Mit EPA / DHA[4] aus Fischöl • Bedarfsdeckend in 1 Easybag / Tag	• Hochkalorisch • Mit Ballaststoffen • Eiweißreich • Mit EPA / DHA[4] aus Fischöl • Bedarfsdeckend in 1 Easybag / Tag	• Normokalorisch • Mit Ballaststoffen • Eiweißreich • Mit EPA / DHA[4] aus Fischöl • Bedarfsdeckend in 1 Easybag / Tag	• Hochkalorisch • Mit Ballaststoffen • Bedarfsdeckend in 1 Easybag / Tag	• Hochkalorisch • Ohne Ballaststoffe
Handelsform	500 ml 1000 ml 1500 ml	500 ml 1000 ml	500 ml 1000 ml	1000 ml	1000 ml	1500 ml	1500 ml	1500 ml	500 ml 1000 ml 1500 ml
Energie	100 kcal/100 ml	100 kcal/100 ml	100 kcal/100 ml	100 kcal/100 ml	120 kcal/100 ml	150 kcal/100 ml	120 kcal/100 ml	150 kcal/100 ml	150 kcal/100 ml
	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml
Fett	30 % 3,4 g	30 % 3,4 g	32 % 3,6 g	24 % 2,7 g	30 % 4,1 g	30 % 3,4 g	30 % 4,1 g	35 % 5,8 g	35 % 5,8 g
Kohlenhydrate	55 % 13,8 g	52 % 13,0 g	49 % 12,1 g	50 % 12,5 g	47 % 14,0 g	52 % 13,0 g	47 % 14,0 g	48 % 18,0 g	50 % 18,8 g
Ballaststoffe	0 % 0 g	3 % 1,5 g	4 % 2,0 g	4 % 2,0 g	3 % 2,0 g	3 % 1,5 g	3 % 2,0 g	2 % 1,5 g	0 % 0 g
Eiweiß	15 % 3,8 g	15 % 3,8 g	15 % 3,8 g	22 % 5,5 g	20 % 6,0 g	15 % 3,8 g	20 % 6,0 g	15 % 5,6 g	15 % 5,6 g
Wasser	84 ml	84 ml	83 ml	82 ml	80 ml	84 ml	80 ml	76 ml	78 ml
Natrium	↓	↓	+	↓	+	+	+	(-)[2]	(-)[2]
Laktose	(-)[2]	(-)[2]	(-)[2]	(-)[2]	(-)[2]	(-)[2]	(-)[2]	(-)[2]	(-)[2]
Fruktose[3]	-	(-)	+	(-)	+	(-)	+	(-)	-
Saccharose[3]	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Cholesterin	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	↓
Purin	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Gluten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carrageen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lactalbumin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Milcheiweiß	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Sojaeiweiß	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Osmolarität	220 mosmol/l	285 mosmol/l	410 mosmol/l	300 mosmol/l	345 mosmol/l	285 mosmol/l	345 mosmol/l	325 mosmol/l	330 mosmol/l
↓↓	≥ CH 8	≥ CH 8	≥ CH 9	≥ CH 8	≥ CH 8	≥ CH 8	≥ CH 8	≥ CH 8	≥ CH 8
[5]	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5
Ausschließliche Ernährung	≥ 1500 ml	≥ 1500 ml	≥ 1500 ml	≥ 1000 ml	≥ 1000 ml	≥ 1500 ml	≥ 1500 ml	≥ 1500 ml	≥ 1500 ml
Ergänzende Ernährung	≥ 500 ml	≥ 500 ml	≥ 500 ml	Fresubin[7] Original Fibre (500 ml)	Fresubin[7] Original Fibre (500 ml)	Fresubin[7] Original Fibre (500 ml)	Fresubin[7] Original Fibre (500 ml)	Fresubin[7] Energy Fibre (500 ml)	≥ 500 ml
Verordnungsfähig	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

STANDARDNAHRUNGEN

	Fresubin Energy Fibre	Fresubin HP Energy	Fresubin 2 kcal HP	Fresubin 2 kcal HP Fibre
	1,5 kcal/ml		2,0 kcal/ml	
Hauptindikationen	Für alle Sondennahrungen: • Kau- und Schluckstörungen • Flüssigkeitsrestriktion	• Hoher Energiebedarf • Konsumierende Erkrankungen • Flüssigkeitsrestriktion	• Erhöhter Energie- und Eiweißbedarf z.B. bei: - Wundheilungsstörungen - Flüssigkeitsrestriktion - Verbrennungen - Intensivpatienten • Ballaststoffunverträglichkeit	• Erhöhter Energie- und Eiweißbedarf z.B. bei: - Wundheilungsstörungen - Flüssigkeitsrestriktion - Verbrennungen - Intensivpatienten • Ballaststoffunverträglichkeit
Produkteigenschaften	• Normokalorisch • Mit Ballaststoffen • Eiweißreich • Mit MCT[6]	• Hochkalorisch • Ohne Ballaststoffe • Eiweißreich • Mit MCT[6]	• Hochkalorisch • Mit Ballaststoffen • Eiweißreich • Mit MCT[6]	• Hochkalorisch • Mit Ballaststoffen • Eiweißreich • Mit MCT[6]
Handelsform	500 ml 1000 ml	500 ml 1000 ml	500 ml	500 ml
Energie	150 kcal/100 ml	150 kcal/100 ml	200 kcal/100 ml	200 kcal/100 ml
	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml
Fett	35 % 5,8 g	35 % 5,8 g	45 % 10 g	45 % 10 g
Kohlenhydrate	48 % 18,0 g	45 % 17,0 g	35 % 17,5 g	33,5 % 16,7 g
Ballaststoffe	2 % 1,5 g	0 % 0 g	0 % 0 g	1,5 % 1,5 g
Eiweiß	15 % 5,6 g	20 % 7,5 g	20 % 10 g	20 % 10 g
Wasser	76 ml	74 ml	72 ml	71 ml
Natrium	↓	↓	↓	↓
Laktose	(-)[2]	(-)[2]	(-)[2]	(-)[2]
Fruktose[3]	(-)	-	-	-
Saccharose[3]	(-)	-	-	-
Cholesterin	(-)	-	-	-
Purin	(-)	(-)	(-)	(-)
Gluten	-	-	-	-
Carrageen	-	-	-	-
Lactalbumin	-	-	-	-
Milcheiweiß	+	+	+	+
Sojaeiweiß	+	+	+	+
Osmolarität	325 mosmol/l	300 mosmol/l	395 mosmol/l	395 mosmol/l
↓↓	≥ CH 8	≥ CH 12	≥ CH 12	≥ CH 12
[5]	≥ CH 8	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5
Ausschließliche Ernährung	≥ 1500 ml	≥ 1500 ml	≥ 1000 ml	≥ 1000 ml
Ergänzende Ernährung	≥ 500 ml	≥ 500 ml	250 - 500 ml	250 - 500 ml
Verordnungsfähig	ja	ja	ja[1]	nein[1]

SPEZIALNAHRUNGEN

	Diben	Survimed OPD	Reconvan	Intestamin
Hauptindikationen	Für alle Sondennahrungen: • Kau- und Schluckstörungen • Flüssigkeitsrestriktion	• Malabsorption z.B. bei: - CED[1] - Kurzdarmsyndrom - Pankreasinsuffizienz - Chemo- oder Strahlentherapie-induzierte Enteritis	• Postoperativ • Posttraumatisch • Verbrennungen	• Kritisch kranke Intensivpatienten mit dem Risiko für: - SIRS[1] - Multiorgansversagen - Sepsis nach großen Operationen bzw. Traumata
Produkteigenschaften	• Gestörte Glukosetoleranz	• Normokalorisch • Mit Ballaststoffen • Kohlenhydratmodifiziert • Niedriger glykämischer Index • Mit EPA / DHA[4] aus Fischöl	• Normokalorisch • Ohne Ballaststoffe • Eiweißreich • Reich an Glutamin • Angereichert mit Arginin • Reich an EPA / DHA[4] aus Fischöl • Mit MCT[6]	• Reich an Glutamin • Reich an Antioxidantien • Angereichert mit Butyrat • Ohne Ballaststoffe • Enterales Supplement (500 ml Tagesdosis)
Handelsform	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml
Energie	100 kcal/100 ml	100 kcal/100 ml	100 kcal/100 ml	50 kcal/100 ml
	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	pro 100 ml
Fett	33 % 4,7 g	40 % 6,7 g	40 % 6,7 g	Glutamin ..... 6 g Arginin ..... 300 mg Vitamin C ..... 100 mg Beta-Carotin ..... 2 mg Zink ..... 4 mg Selen ..... 40 µg Tributyrin ..... 200 mg
Kohlenhydrate	53,5 % 17,4 g	31 % 11,8 g	50 % 12,5 g	48,5 % 12,1 g
Ballaststoffe	1,5 % 1,0 g	2 % 1,2 g	0 % 0 g	1,5 % 0,8 g
Eiweiß	12 % 4,0 g	27 % 10,0 g	10 % 2,5 g	10 % 2,5 g
Wasser	78 ml	76 ml	84 ml	84 ml
Natrium	↓	↓	↓	↓
Laktose	(-)[2]	(-)[2]	-	(-)
Fruktose[3]	(-)	(-)	-	(-)
Saccharose[3]	+	+	(-)	(-)
Cholesterin	(-)	↓	↓	↓
Purin	(-)	(-)	(-)	(-)
Gluten	-	-	-	-
Carrageen	-	-	-	-
Lactalbumin	-	-	-	-
Milcheiweiß	+	+	+	+
Sojaeiweiß	+	+	+	+
Osmolarität	330 mosmol/l	340 mosmol/l	220 mosmol/l	220 mosmol/l
↓↓	≥ CH 8	≥ CH 8	≥ CH 5	≥ CH 5
[5]	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5
Ausschließliche Ernährung	≥ 1500 ml	≤ 1000 ml	1000 - 2500 ml	1000 - 2500 ml
Ergänzende Ernährung	≥ 500 ml	500 ml	500 - 1000[1] ml	500 - 1000[1] ml
Verordnungsfähig	ja[1]	nein[1]	ja	ja

SPEZIALNAHRUNGEN / ALTERSANGEPASSTE NAHRUNGEN

	Fresubin Hepa	Supportan	Fresubin Original	Fresubin Original Fibre	Fresubin Energy	Fresubin Energy Fibre
			1,0 kcal/ml		1,5 kcal/ml	
Hauptindikationen	Für alle Sondennahrungen: • Kau- und Schluckstörungen • Behinderung der Nahrungspassage	• Hepatische Enzephalopathie • Gestörte Leberfunktionsparameter (insbesondere bei Kindern)	• Konsumierende Erkrankungen (z.B. Tumorerkrankungen) • Kachexie • Künstliche Beatmung	• Ballaststoffunverträglichkeit z.B. bei: - CED[1] - Kurzdarm (Stabilisierungsphase) - Postoperative Dickdarmstenose	• Neurologische Erkrankungen • Konsumierende Erkrankungen • Mukoviszidose	• Ballaststoffunverträglichkeit z.B. bei: - CED[1] - Kurzdarm (Stabilisierungsphase) - Postoperative Dickdarmstenose • Flüssigkeitsrestriktion • Konsumierende Erkrankungen	• Neurologische Erkrankungen • Konsumierende Erkrankungen • Flüssigkeitsrestriktion • Mukoviszidose
Produkteigenschaften	• Hochkalorisch • Mit Ballaststoffen • Erhöhter Gehalt an verzweigkettigen Aminosäuren und Arginin • Niedrig an aromatischen Aminosäuren und Methionin • Mit MCT[6]	• Hochkalorisch • Mit Ballaststoffen • Eiweißreich • Reich an EPA / DHA[4] aus Fischöl • Fettreich • Kohlenhydratreduziert • Mit MCT[6]	• Normokalorisch • Ohne Ballaststoffe • Eiweißreich • Reich an Glutamin • Angereichert mit Arginin • Reich an EPA / DHA[4] aus Fischöl • Mit MCT[6]	• Normokalorisch • Mit Ballaststoffen • Eiweißreich • Mit EPA / DHA[4] aus Fischöl • Mit MCT[6]	• Hochkalorisch • Ohne Ballaststoffe • Eiweißreich • Mit EPA / DHA[4] aus Fischöl • Kinder ab 1 Jahr	• Hochkalorisch • Mit Ballaststoffen • Eiweißreich • Mit EPA / DHA[4] aus Fischöl • Kinder ab 1 Jahr	• Hochkalorisch • Mit Ballaststoffen • Eiweißreich • Mit EPA / DHA[4] aus Fischöl • Kinder ab 1 Jahr
Handelsform	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml
Energie	130 kcal/100 ml	150 kcal/100 ml	100 kcal/100 ml	100 kcal/100 ml	150 kcal/100 ml	150 kcal/100 ml	150 kcal/100 ml
	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml	Energie% pro 100 ml
Fett	33 % 4,7 g	40 % 6,7 g	40 % 4,4 g	40 % 4,4 g	40 % 6,7 g	40 % 6,7 g	40 % 6,7 g
Kohlenhydrate	53,5 % 17,4 g	31 % 11,8 g	50 % 12,5 g	48,5 % 12,1 g	49,8 % 18,7 g	48,3 % 18,1 g	50 % 18,8 g
Ballaststoffe	1,5 % 1,0 g	2 % 1,2 g	0 % 0 g	1,5 % 0,8 g	0 % 0 g	1,5 % 1,1 g	0 % 0 g
Eiweiß	12 % 4,0 g	27 % 10,0 g	10 % 2,5 g	10 % 2,5 g	10,2 % 3,8 g	10,2 % 3,8 g	10,2 % 3,8 g
Wasser	78 ml	76 ml	84 ml	84 ml	79 ml	79 ml	79 ml
Natrium	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Laktose	(-)[2]	(-)[2]	-	(-)	(-)[2]	(-)[2]	(-)[2]
Fruktose[3]	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-
Saccharose[3]	+	+	(-)	(-)	+	+	+
Cholesterin	(-)	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Purin	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Gluten	-	-	-	-	-	-	-
Carrageen	+	-	-	-	-	-	-
Lactalbumin	-	-	-	-	-	-	-
Milcheiweiß	+	+	+	+	+	+	+
Sojaeiweiß	+	+	+	+	+	+	+
Osmolarität	330 mosmol/l	340 mosmol/l	220 mosmol/l	220 mosmol/l	345 mosmol/l	345 mosmol/l	345 mosmol/l
↓↓	≥ CH 8	≥ CH 8	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 6,5	≥ CH 6,5	≥ CH 6,5
[5]	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 6,5
Ausschließliche Ernährung	≥ 1500 ml	≤ 1000 ml	1000 - 2500 ml	1000 - 2500 ml	1000 - 2000 ml	1000 - 2000 ml	1000 - 2000 ml
Ergänzende Ernährung	≥ 500 ml	500 ml	500 - 1000[1] ml	500 - 1000[1] ml	500 ml	500 ml	500 ml
Verordnungsfähig	ja[1]	nein[1]	ja	ja	ja	ja	ja

Farbkodierung

Standardnahrungen

Erwachsene:

- 1,0 –1,2 kcal/ml
- 1,5 kcal/ml
- 2,0 kcal/ml

Kinder:

- 1,0 kcal/ml
- 1,5 kcal/ml

Spezialnahrungen:

- Gestörte Glukosetoleranz
- Eingeschränkte Verdauungsleistung
- Leberinsuffizienz
- Niereninsuffizienz
- Tumorerkrankungen
- Dysphagie

Bestellinformation

Artikelbezeichnung	Handelsform	Art-Nr.	PZN
Fresubin® Original			
Neutral	5 x 1500 ml EasyBag	7577242	02840448
Neutral	8 x 1000 ml EasyBag	7577233	01404225
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7577227	01403958
Neutral	12 x 500 ml Glasflasche	7577209 A	01348372
Vanille	12 x 500 ml Glasflasche	7516093 A	01564578
Schokolade	12 x 500 ml Glasflasche	7517079 A	01564762
Pfirsich	12 x 500 ml Glasflasche	7518094 A	01564785
Nuss	12 x 500 ml Glasflasche	7519093 A	01564821
Fresubin® Original Fibre			
Neutral	8 x 1000 ml EasyBag	7527233 E	01404188
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7527227 E	01404194
Neutral	12 x 500 ml Glasflasche	7527209 A	01394136
Fresubin® Soya Fibre			
Neutral	8 x 1000 ml EasyBag	7130233 E	01027024
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7130227 E	01027018
Neutral	12 x 500 ml Glasflasche	7130209 A	01026929
Fresubin® 1000 Complete			
Neutral	8 x 1000 ml EasyBag	7386233 E	06973407
Fresubin® 1200 Complete			
Neutral	8 x 1000 ml EasyBag	7385233 E	00809167
Fresubin® 1500 Complete			
Neutral	5 x 1500 ml EasyBag	7580242	06973175
Fresubin® 1800 Complete			
Neutral	5 x 1500 ml EasyBag	7579242	06973235
Fresubin® 2250 Complete			
Neutral	5 x 1500 ml EasyBag	7526242	03878513
Fresubin® Energy			
Neutral	5 x 1500 ml EasyBag	7368242	04406618
Neutral	8 x 1000 ml EasyBag	7368233	02840514
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7368227	02840483
Neutral	12 x 500 ml Glasflasche	7368209 A	02840460
Fresubin® Energy Fibre			
Neutral	8 x 1000 ml EasyBag	7526233 E	01404076
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7526227 E	01404107
Neutral	12 x 500 ml Glasflasche	7526209 A	01394107
Fresubin® HP Energy			
Neutral	8 x 1000 ml EasyBag	7348233 E	01554427
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7348227 E	01554404
Neutral	12 x 500 ml Glasflasche	7348209 A	01554433
Fresubin® 2 kcal HP			
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7190227 E	09723378
Fresubin® 2 kcal HP Fibre			
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7191227 E	09723390
Supportan®			
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7251227 E	01565017
Fresubin® Hepa			
nicht trinkbar	15 x 500 ml EasyBag	7147227 E	03042660
Reconvan®			
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7252227 E	01565081
Survimed® OPD			
Neutral	8 x 1000 ml EasyBag	7215233 E	07391630
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7347227 E	01554321
Neutral	12 x 500 ml Glasflasche	7347209 A	01554373
Fresubin® Hepa			
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7131227 E	04102855
Diben®			
Neutral	5 x 1500 ml EasyBag	7596242	01468024
Neutral	8 x 1000 ml EasyBag	7596233 E	01467361
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7596227 E	01467303
Neutral	12 x 500 ml Glasflasche	7596209 A	01466976
Fresubin® Original			
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7469227 E	02421303
Fresubin® Original Fibre			
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7470227 E	01554462
Neutral	12 x 500 ml Glasflasche	7470209 A	01554539
Fresubin® Energy			
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7467227 E	02424365
Fresubin® Energy Fibre			
Neutral	15 x 500 ml EasyBag	7468227 E	01554574

Indikationen:

Enterale Ernährung ist generell indiziert bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung (vgl. Arzneimittel-Richtlinie Abschnitt I des Gemeinsamen Bundesausschusses in der aktuellen Fassung). Die in der Produktübersicht aufgelisteten enteralen Nahrungen sind für den Einsatz bei den entsprechenden Hauptindikationen besonders geeignet. Ausführlichere Informationen finden Sie im Produktkatalog Trink- und Sondennahrungen.

1) Bei fehlender, oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnungsfähig
2) Bei zusätzlich vorliegender Fettverwertungsstörung oder Malassimilationssyndrom
3) Bei zusätzlich vorliegender hepatischer Enzephalopathie
4) Bei zusätzlich vorliegender Mukoviszidose
5) Bei zusätzlich vorliegender Niereninsuffizienz
6) Rezeptierung auf grünem Rezept / Privatrezept
7) Mittlere Tagesdosis
8) Altersabhängig
9) Nicht geeignet bei Galaktosämie
10) MCT = Mittelkettige Triglyceride
11) EPA = Eicosapentaensäure, DHA = Docosahexaensäure
12) CED = Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
13) SIRS = Systemisches Inflammations-Response Syndrom
14) TE = Tocopherolquivalente
15) COPD = Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung
16) Schokolade
17) Schokolade: ballaststoffarm
18) Zubereitung: 1 Sachet in 240 ml Milch
19) Zubereitung: 1 Sachet in 200 ml Wasser
20) **Zur Beachtung:** Bei hereditärer Fruktoseteleranz (HFI) sollten alle Produkte, die Fruktose enthalten (inklusive Saccharose, Inulin und Oligofruktose) streng gemieden werden.

– frei von
(-) praktisch frei von / streng arm an
\+ enthält / reich an
↓ arm an (Natrium ≤ 120 mg /100 ml bzw. Cholesterin ≤ 300 mg /100 ml)
[5] Empfehlung zur Sondengröße bei pumpenassistierter Applikation
↓↓ Empfehlung zur Sondengröße bei Schwerkraftapplikation
k.A. es liegen keine Analysedaten vor

Von Oktober 2015 bis Sommer 2016 wird das Design der Trinknahrungen umgestellt. Konversionspläne finden Sie immer aktuell auf unserer Internetseite www.fresenius-kabi.de.

FRESENIUS KABI
caring for life

Trink- und Sondennahrung

Produktübersicht
Stand: Januar 2016

wir helfen Menschen

Trinknahrungen und orale Supplemente

STANDARDNAHRUNGEN

	Fresubin Original	Fresubin Energy	Fresubin Energy Fibre	Fresubin Soup	Fresubin Protein Energy	Fresubin 2 kcal	Fresubin 2 kcal Fibre
	1,0 kcal / ml	1,5 kcal / ml				2,0 kcal / ml	
Hauptindikation	• Appetitlosigkeit • Rekonvaleszenz	• Erhöhter Energiebedarf • Appetitlosigkeit • Rekonvaleszenz	• Erhöhter Energiebedarf • Appetitlosigkeit • Rekonvaleszenz	• Erhöhter Energiebedarf • Appetitlosigkeit • Rekonvaleszenz • Wunsch nach herzhaften Geschmack	• Erhöhter Eiweiß- und Energiebedarf (z.B. bei konsumierenden Erkrankungen, Mundverletzungen) • Flüssigkeitsrestriktion (z.B. bei Niereninsuffizienz während Dialyse) • COPD*